

Anwendung von 74-188 Pheroprax und 74-170 Chalcoprax

Die Pheromonampulle wird in einem verschweißten Aluminiumbeutel geliefert. Diese Verpackung vorsichtig öffnen und die Ampulle entnehmen und in Schlitzfallen (Nr. 75-010, 75-007 und 75-001) oder der Segmenttrichterfalle (Nr. 75-148) mittig platzieren.

Vorsicht beim Öffnen der Verpackung – Ampulle nicht beschädigen!

Achtung: Die Ampulle selbst darf nicht angestoßen oder angeschnitten werden!

Durch den Spezialkunststoff diffundiert das Pheromon kontrolliert nach außen! Bei hohen Temperaturen und damit einhergehender hoher Borkenkäferaktivität diffundiert mehr Lockstoff durch die Ampullenwand. Bei niedrigen Temperaturen und wenig Borkenkäferaktivität wird entsprechend weniger Lockstoff freigegeben.

Die Wirkungsdauer beträgt witterungsbedingt ca. 8 Wochen. Danach wird die nächste Ampulle in der Falle platziert.

Durch die Ampullentechnik ist der Füllstand zu erkennen. Dadurch kann der richtige Zeitpunkt zum Ergänzen der nächsten Ampulle exakt ermittelt werden.

(Produktionsbedingt sind die Ampullen nur knapp zu Hälfte gefüllt).

Die längerfristige Lagerung von Pheromonen erfolgt idealerweise im Kühlschrank oder im Gefrierschrank bei -18 C.